

药 讯

(第一百六十三期)

梅州市第二中医医院药剂科主办

2022年6月6日

药事动态

《广东省医疗保障局 广东省工业和信息化厅 广东省卫生健康委 广东省药监局关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展实施方案》政策解读.....2

健康养生

内伤脾胃，百病由生！夏季脾胃病多发，莫忘养护脾胃.....5

临床用药

常见 27 种外用用药的功效、联合用药、禁忌.....8

【药事动态】

广东省医疗保障局 广东省工业和信息化厅 广东省卫生健康委 广东省药监局关于推动药品集中带量采购工作 常态化制度化开展实施方案解读

发布日期：2022-05-13

解读内容如下：

一、《实施方案》的起草背景

推进药品集中带量采购工作是党中央、国务院深化医药服务供给侧改革和医药卫生体制改革的重要举措。2021年1月，国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号），要求各地全面推进药品集中带量采购工作的常态化。2022年1月10日李克强总理在国务院常务会议上提出进一步推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面，以慢性病、常见病为重点，继续推进药品集采。特别是2月11日国务院新闻办公室举行的深化药品和高值医用耗材带量采购改革进展国务院政策例行吹风会上，指出未来将进一步推进集采提速扩面。为贯彻落实国务院的工作部署，全方位推动我省的药品集中带量采购，使集采成为常态，稳定社会预期，净化行业生态，促进医药行业高质量发展，保障群众获得优质实惠的医药服务，经认真总结我省药品耗材带量采购工作经验，广泛开展调查论证和征求意见，经省政府同意，省医疗保障局会同省工业和信息化厅、卫生健康委药监局联合印发本《实施方案》。

二、《实施方案》的总体框架和主要内容

（一）目标任务。建立完善需求导向、招采合一、量价挂钩、公平透明、协同高效的药品带量采购机制，2025年实现省级带量采购覆盖国内上市临床必需、质量可靠的各类药品，做到应采尽采。

（二）常态化制度化开展省级药品集中带量采购。包括实施范围、采购需求、竞争规则、中选规则、采购协议等5条措施。

（三）优化提升系统集成的配套措施。包括质量保障、供应配送、货款结算、临床使用、医保支付等5条措施。

（四）组织保障。包括组织领导、运行机制、宣传引导等 3 条措施。

三、《实施方案》的主要特点

（一）坚持需求导向，保障使用。一是加快应采尽采。由省医保部门统筹开展，重点将医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入省级药品带量采购范围。二是明确采购主体。公立医疗机构以及按照定点协议管理要求参照执行的医保定点社会办医疗机构和定点药店为集中带量采购工作的采购主体。三是尊重医疗机构的采购需求。采购主体根据上年度使用量等因素确定采购周期第一年的采购需求量，由操作的采购平台形成采购清单予以公开，并由采购主体再次确认后形成约定采购量。

（二）坚持市场运作，促进竞争。一是结合国家关于竞争规则的要求，坚持市场主导，促进竞争，根据各类药品的属性、结合临床使用特性和替代性分类竞价。二是药品不管是否通过一致性评价，均不设置质量分组。三是进一步细化国家关于同通用名药品合并竞争的原则性规定，按照医保药品目录的分类原则，未过评药品要按照采购清单，同通用名同一给药途径的药品分组原则上不超过 2 个。四是明确通过一致性评价的药品是指同通用名同剂型，其数量超过 3 个的，未过评的药品不再纳入我省药品集采范围。

（三）坚持量价挂钩，以量激励。一是在采购主体按需采购、医药企业自主报价的前提下，创新性提出“梯度报价、按需采购、以量激励”的中选规则，突出运用新增采购量对医药企业和医疗机构的正面双向激励，实现以量换价，量价挂钩，二是建立中选产品差比价关系，以市场机制来解决降价问题，促进中选产品价格的合理回归，确保临床主流产品使用的延续性和可及性。

（四）坚持系统集成，协同推进。一是加强质量监管，将中选药品列入重点监管品种，对我省中选企业实施“一企一档”管理，开展全覆盖的监督检查和抽样检验。二是在供应配送方面，鼓励药品采购平台建立完善供应链管理机制。三是明确将医疗机构采购使用省带量采购中选药品情况纳入医保基金监管范畴。四是在医保支付方面，建立医保支付标准与中选价格协同的动态调整机制，引导和激励医疗机构主动使用中选药品。同时加强结余激励引导。

四、《实施方案》的落实要求

《实施方案》提出以下落实措施：一是明确每年至少统筹开展一次省级药品集中带量采购，加强对广州、深圳药品集中带量采购工作的指导和统筹协调。各地加强对本地区药品集中带量采购工作的组织领导。二是鼓励医疗机构自主或委托第三方以区域联盟、医联体、医共体、医院联合等方式开展集中带量采购。各级医保部门不得针对采购主体选择不同的采购平台设置保护性或歧视性条款。加强采购平台规范化建设，统一使用国家医保药品分类与代码，统一药品采购信息标准。促进采购过程管理和绩效管理的统一，从单纯交易向供应链等服务延伸。三是加强正面宣传和引导，做好政策解释引导，营造良好氛围。

【健康养生】

内伤脾胃，百病由生！ 夏季脾胃病多发，莫忘养护脾胃

炎炎夏日，暑热难耐，人们常会觉得不思饮食、浑身倦怠。从夏季气候特点上来看，人体脾胃的运化功能极易受到暑湿邪气的影响，从而导致食欲下降、倦怠乏力。所以夏天更应该重视调养脾胃，正所谓“脾胃强，好度夏”。

中医认为“脾胃为后天之本”。人出生以后，生命活动所需的很多营养物质有赖于后天脾胃的摄入。胃主受纳，脾主运化，食物进入胃以后，由胃进行磨化腐熟，然后由脾进行消化、吸收，化生为精微营养物质，并将精微物质输布全身，产生的糟粕由肠道排出。

金元时代著名医家李东垣认识到脾胃功能的重要性，在其《脾胃论》中指出：“内伤脾胃，百病由生。”若脾胃虚弱，运化失常，精微物质生化无源，则会出现神疲乏力、气短头晕等症状；若脾胃运化失司，体内的水液不能正常代谢，停聚而生湿、生痰，则会出现腹胀、腹泻、水肿、咳嗽等。

那么，脾胃病为什么常常在夏季多发？主要是因为脾喜燥恶湿，容易为暑湿所伤。脾胃病有虚、实之分，在临床常见的证型中，脾胃湿热证、寒湿困脾证为实证；脾气虚证、脾阳虚证、胃阴虚证为虚证。

常见脾胃病证型

01 脾胃湿热证

表现为脘腹胀闷、纳呆、恶心欲呕、口中黏腻、渴不多饮、便溏不爽、小便短黄、肢体困重，舌质红、苔黄腻，脉濡数或滑数。本证多由外感湿热之邪、喜食油腻辛辣食物、过度饮酒所致。

02 寒湿困脾证

表现为脘腹胀闷、口腻纳呆、泛恶欲呕、口淡不渴、腹痛便溏、头身困重，舌淡胖、舌苔白滑或白腻，脉濡缓或沉细。本证多因淋雨涉水，居住环境潮湿，气候阴雨；或由于过食生冷瓜果、喜食肥甘厚味所致。

03 脾气虚证

表现为食少纳呆、脘腹胀满、食后胀甚、饥时饱胀、大便溏稀、肢体困倦、神疲乏力、少气懒言、面色淡黄或萎黄，舌淡苔白，脉缓或弱。本证多因饮食不节、太过劳累，或忧思日久、素体虚弱、年老体衰、大病初愈、调养失慎等所致。

04 脾阳虚证

表现为食少、腹胀、腹痛绵绵、喜温喜按、畏寒怕冷、四肢不温、面白少华或虚浮、口淡不渴、大便稀溏，甚至完谷不化、小便短少，舌苔白滑，脉沉迟无力。本证多因脾气虚进一步进展，或因过食生冷、过用苦寒药物，或肾阳不足，命门火衰，火不生土所致。

05 胃阴虚证

表现为胃脘嘈杂、饥不欲食、或痞胀不舒、隐隐灼痛、干呕、呃逆、口燥咽干、大便干结、小便短少、舌红少苔乏津、脉细数。本证多因热病后期，胃阴耗伤；或情志郁结，或吐泻太过，或过食辛辣、香燥之品，过用温热辛燥药物所致。

几种简单中医外治法

针对不同的症群，中医治疗的手段多采取辨证论治的原则，因时因人制宜，且用药灵活多变，在保养脾胃方面有着明显优势。下面介绍几种中医外治法。

01 拔罐疗法

脾胃湿热证、寒湿困脾证可选用膀胱经走罐，脾俞、胃俞、中脘穴留罐。

02 艾灸治疗

隔姜灸中脘、足三里、神阙、关元、脾俞等穴，适用于脾气虚、脾阳虚人群；艾灸天枢、足三里、胃俞等穴，适用于寒湿困脾证人群。

03 穴位按压

点按中脘、足三里，手掌轻揉神阙，适用于各证型人群。

04 中药脐敷

- 脾胃湿热证人群可用黄连、黄芩、大黄各等分，磨粉后用水调成糊状敷脐。
- 寒湿困脾、脾气虚、脾阳虚证人群可选用干姜、肉桂、豆蔻各等分，磨粉后用生姜汁调成糊状敷脐。

05 中药足浴

- 脾胃湿热证人群可用黄连、藿香各 20 克，六一散（滑石、甘草）30 克。

- 寒湿困脾证人群可选用：紫苏、陈皮各 20 克，藿香 30 克。
- 脾气虚、脾阳虚证人群可用白术、干姜、茯苓各 20 克。
- 胃阴虚证人群可选用北沙参、玉竹、麦冬各 20 克。

除了上述几种方法，给大家再推荐几款药膳：

■绿豆粥：绿豆性寒味甘，有清热解毒，降火消暑的功效，适合脾胃湿热证人群。

■陈皮粥：陈皮性味苦辛，有理气健脾、燥湿化痰的功效，适合寒湿困脾证人群。

■益胃粥：取益胃汤之义，具有养阴益胃之功效，取沙参 9 克、麦冬 15 克、冰糖 3 克、细生地 15 克、玉竹 5 克，先煎出药汁，再加入大米煮成稀粥即成，适合胃阴虚证人群。

【临床用药】

常见 27 种外用用药的功效、联合用药、禁忌

夏季是皮肤病的多发季，另外穿的较少，一不小心就会蹭伤、擦伤。对于不同的伤口病症，你知道怎么选择外用药物吗？

医用酒精

作用：医用酒精，浓度高低不同，其用途也各不相同。

70%~75%——灭菌消毒

包括皮肤消毒、医疗器械消毒、碘酒的脱碘等。由于酒精具有一定的刺激性，75%的酒精可用于皮肤消毒，不可用于黏膜和大创面的消毒。

40%~50%——预防褥疮

将少量 40%~50%的酒精倒入手中，均匀地按摩患者受压部位，以达到促进局部血液循环、防止褥疮形成的目的。

25%~50%——物理退热

将纱布或柔软的小毛巾用酒精蘸湿，拧至半干，轻轻地擦拭其的颈部、胸部、腋下、四肢和手脚心。

注意事项：一般药店医用酒精的浓度为 75%。酒精的刺激性强，不能用于大面积的伤口，也不能用于黏膜部位。对于较深的伤口来说，用酒精也不合适，存在破伤风感染的风险。

如果伤口污染不严重，可以先用生理盐水冲洗，然后用酒精以伤口为中心向皮肤四周擦洗；如果伤口污染严重，可以先用双氧水冲洗，再用生理盐水冲洗，然后再用酒精消毒。

碘酒

作用：碘酒，即碘酊，浓度一般为 2%~5%，外用，可用于皮肤消毒。用完后应该使用 75%酒精进行脱碘，要不然会烧伤皮肤。

注意事项：碘酒有强大的杀菌作用，常用于擦伤、挫伤、割伤等一般外伤的消毒。但碘酒的刺激性较大，可能引发强烈的烧灼疼痛感。

不宜用于破损皮肤、眼及口腔黏膜的消毒。不能大面积使用碘酒，以防

大量碘吸收而出现碘中毒。此外，碘酒也不能与红药水同时使用，两者会发生反应生成碘化汞，容易汞中毒。

碘伏

作用：医用碘伏通常浓度较低(1%或以下)，呈浅棕色，也是一种常用的皮肤消毒剂。

注意事项：碘伏可用于一般外伤的消毒。与酒精相比，碘伏的刺激性小，可直接用于破损皮肤、口腔黏膜处的消毒。稀释 2 倍可用于口腔炎漱口、稀释 10 倍可用于阴道炎冲洗治疗。

红药水

作用：又名红汞，其穿透性很弱，杀菌、抑菌作用有限，但无刺激性，适用于新鲜的小面积皮肤或黏膜外伤（如擦伤、碰伤等）的消毒。

注意事项：汞过敏者，不宜使用红药水，否则会引起接触性皮炎。

汞离子有轻微的毒性，口腔内伤口、身体内的深部伤口，或者大面积的感染化脓创面不宜使用。

紫药水

作用：又名龙胆紫或甲紫溶液，是一种常用的皮肤、黏膜消毒剂。

无刺激性，涂抹伤口不会造成疼痛不适。临床上常用于治疗皮肤及黏膜的创伤和感染，还包括湿疹、癣症、鹅口疮、口腔溃疡、舌炎等。用时也可以用于小面积的烧伤。

注意事项：紫药水杀菌力强，刺激性较小，曾是一种常用的皮肤消毒剂。但近年来，有研究认为，紫药水中的龙胆紫有潜在的致癌可能。

因此，紫药水只能用于完整的、未破损的皮肤，不可涂抹于破损的皮肤伤口上。不宜用来涂擦化脓性伤口。不宜与红药水或碘酒(碘酊)一起使用。涂抹时建议用棉签。

双氧水

作用：双氧水作为一种强氧化剂，能清洁伤口、预防感染，属于强效杀菌药物，主要用于较深的伤口。

受伤后可以先用双氧水清洁伤口，再使用其他外伤药物保持伤口始终处于湿润的状态，才能加速愈合，并预防肉芽组织增生形成的疤痕。

注意事项：当皮肤出现伤口时，可以先用双氧水清洁伤口，再使用其他皮肤消毒剂。

红花油

作用：红花油是一种中医外用药，有镇痛、抗炎、消肿的作用，常用于跌打扭伤导致的软组织挫伤和轻微烫伤，

注意事项：不能用于擦伤、割伤等有皮肤破损的外伤，也不能接触眼睛、口腔等黏膜。但要注意，损伤后 24 小时之后再使用，否则会加重伤情。

红霉素软膏

作用：红霉素是一种常用的外用抗生素，价格便宜，用途也非常广泛。对于化脓性的皮肤感染，可以把药膏薄薄涂抹于患处。

对于轻微的挫伤、划伤，可以先将患处清洗消毒，再涂抹上适量药膏。对于小面积的烧伤、烫伤，可以先用冷水冲洗一下伤口再涂抹药膏。

注意事项：涂抹时不能涂的太厚。红霉素软膏的使用不宜超过 1 周。

阿昔洛韦乳膏

作用：用于单纯疱疹或带状疱疹感染。

联合用药：阿昔洛韦片/泛昔洛韦+阿昔洛韦乳膏

不良反应：可见轻度疼痛、瘙痒及皮疹。

注意事项：孕妇、哺乳期妇女慎用。过敏者禁用，若有过敏反应停用。涂药时要戴手套。连续 7 日症状不缓解，请咨询医师。

丹皮酚软膏

作用：抗过敏，消炎止痒。用于各种湿疹、皮炎、虫咬性皮炎、皮肤瘙痒、过敏性鼻炎。

联合用药：

过敏性皮炎：西替利嗪+丹皮酚软膏

过敏性鼻炎：通窍鼻炎片+氯雷他定+丹皮酚软膏

虫咬性皮炎：消炎粉/消炎止痒水+丹皮酚软膏

注意事项：过敏者禁用

复方醋酸地塞米松乳膏

作用：用于各种接触性皮炎、过敏性皮炎、神经性皮炎、湿疹。

联合用药：西替利嗪/氯雷他定+复方地塞米松乳膏

不良反应：不可长期使用，易导致皮肤萎缩色素沉着，毛细血管扩张。

注意事项：皮肤破溃、化脓、渗出者禁用。病毒感染禁用，不宜长期使用。

甲硝唑凝胶

作用：用于各种炎症性皮炎、酒糟鼻。

联合用药：抗菌消炎药+甲硝唑凝胶+龙胆紫。

不良反应：偶见皮肤干燥、烧灼感等过敏反应。

注意事项：孕妇哺乳期妇女禁用。过敏者禁用。

氧氟沙星凝胶

作用：用于各种炎症性皮炎。

联合用药：氧氟沙星凝胶+盐酸左氧氟沙星片/阿奇霉素。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：过敏者禁用。真菌感染时不用。

老鹳草软膏

作用：可用于湿疹，皮炎小面积的水、火烫伤。

联合用药：

湿疹、皮炎：西替利嗪/氯雷他定+老鹳草软膏

烧烫伤：老鹳草软膏+百多邦+口服消炎药

复方硝酸咪康唑乳膏

作用：用于各种真菌感染。

联合用药：

手癣：复方硝酸咪康唑乳膏（封包疗法）+氟康唑+珊瑚癣静

体、股癣：复方硝酸咪康唑乳膏+口服氟康唑（疗程 1~4 周）

指甲癣：复方硝酸咪康唑乳膏+口服氟康唑+亮甲（疗程 6 个月）

足癣：足光粉+复方硝酸咪康唑乳膏+斯皮仁诺（疗程 1 个月）

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：孕妇哺乳期妇女慎用。皮肤破溃处慎用。

联苯苄唑乳膏

作用：用于各种真菌感染。

联合用药：

手癣：联苯苄唑乳膏（封包疗法）+氟康唑+珊瑚癣静

体、股癣：联苯苄唑乳膏+口服氟康唑（疗程1~4周）。

指甲癣：联苯苄唑乳膏+口服氟康唑+亮甲（疗程6个月）。

足癣：足光粉+联苯苄唑乳膏+斯皮仁诺（疗程1个月）。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：孕妇哺乳期妇女慎用。皮肤破溃处慎用。

曲安奈德益康唑乳膏

作用：用于各种真菌感染、皮炎、湿疹。

联合用药：

手癣：曲安奈德益康唑乳膏（封包疗法）+口服氟康唑+珊瑚癣静。

体、股癣：曲安奈德益康唑+口服氟康唑（疗程1~4周）。

指甲癣：曲安奈德益康唑+口服氟康唑+亮甲（疗程6个月）。

足癣：足光粉+曲安奈德益康唑+斯皮仁诺（疗程1个月）。

过敏性皮炎：西替利嗪+曲安奈德益康唑（疗程2~4周）。

不良反应：过敏反应，皮肤萎缩，色素沉着，局部毛细血管扩张。

注意事项：不得长期大面积使用，有病毒感染禁用。连续使用不得超过4周，面部、腋下、腹股沟、外阴等皮肤细薄处不宜使用超过2周。

硝酸益康唑喷剂

作用：用于各种真菌感染。

联合用药：

足癣：足光粉+曲安奈德益康唑乳膏+硝酸益康唑喷剂。

花斑癣：曲安奈德益康唑乳膏+硝酸益康唑喷剂。

头癣：灰黄霉素+硝酸益康唑喷剂+复方酮康唑发用洗剂。

体、股癣：口服氟康唑+硝酸益康唑喷剂。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：过敏者禁用，过敏反应停用。病毒感染禁用。避免接触眼睛和其他粘膜。

酮康唑乳膏

作用：用于各种真菌感染。

联合用药：

手癣：酮康唑乳膏（封包疗法）+口服氟康唑+珊瑚癣静。

体、股癣：酮康唑乳膏+口服氟康唑（疗程 1~4 周）。

指甲癣：酮康唑乳膏+口服氟康唑+亮甲（疗程 6 个月）。

足癣：足光粉+酮康唑乳膏+斯皮仁诺（疗程 1 个月）。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：孕妇哺乳期妇女慎用。皮肤破溃处慎用。

无极膏

作用：用于消炎、镇痛、止痒、抗菌。

联合用药：

虫咬性皮炎：阿莫西林+无极膏。

丘疹性荨麻疹：氯雷他定+无极膏。

不良反应：偶见皮肤刺激症。

注意事项：

孕妇哺乳期妇女禁用。

皮肤损伤糜烂或开放性伤口处禁用。

病毒感染禁用，不得长期大面积使用；有病毒感染禁用。

连续使用不得超过 4 周，面部、腋下、腹股沟、外阴等皮肤细薄处不宜使用超过 2 周。运动员慎用。

盐酸赛庚啶乳膏

过敏性鼻炎。

联合用药：西替利嗪/氯雷他定+盐酸赛庚啶乳膏

不良反应：偶见皮肤刺激症，过敏反应。

注意事项：

孕妇哺乳期妇女禁用，不得用于急性炎症。

糜烂或有渗出的皮肤损害处，不宜长期大面积使用。青光眼，高空作业者慎用。

有灼烧感，红肿等情况应停用。过敏者禁用，过敏体质者慎用。

盐酸特比萘芬喷剂

作用：用于各种真菌感染。

联合用药：

足癣：足光粉+曲安奈德益康唑乳膏+硝酸益康唑喷剂。

花斑癣：曲安奈德益康唑乳膏+硝酸益康唑喷剂。

头癣：灰黄霉素+硝酸益康唑喷剂+复方酮康唑发用洗剂。

体、股癣：口服氟康唑+硝酸益康唑喷剂。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：过敏者禁用，过敏反应停用。病毒感染禁用。避免接触眼睛和其他粘膜。

复方硝酸咪康唑软膏

作用：用于体股癣、足癣等，也用于丘疹性荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒症等。

联合用药：

癣症：复方硝酸咪康唑软膏+氟康唑片/伊曲康唑片/灰黄霉素/百癣夏塔热片+护肝片。

荨麻疹：复方硝酸咪康唑软膏+盐酸西替利嗪片/氯雷他定片+肤痒颗粒+维生素 C。

湿疹：复方硝酸咪康唑软膏+消风止痒颗粒/湿毒清+维生素 C。

注意事项：

皮肤损伤、糜烂或开放性伤口处禁用。病毒感染者（如有疱疹、水痘）禁用。只限外用，避免接触眼睛及其他黏膜部位，严禁口服。孕妇、哺乳期妇女慎用。不宜大面积、长期使用；用药一周后症状未缓解，请咨询医师。

在使用本品过程中，若出现红斑或皮肤过敏，应立即停用。如并发细菌或真菌感染，请咨询医师处理。

肤痔清软膏

作用：由于各种手足癣，体、股癣，内外痔，带下病。

联合用药：

内外痔：痔速宁/六味消痔/痔炎消/裸花紫珠+肤痔清软膏。

带下病：盐酸左氧氟沙星+妇炎净/妇炎康/抗宫炎+ 服痔清软膏。

不良反应：偶见过敏反应。

注意事项：孕妇禁用。如果带下病伴有血性分泌物或伴尿频尿急尿痛，请去就医。

复方双花藤止痒擦剂

作用：用于各种湿疹、皮炎导致的皮肤瘙痒。

联合用药：西替利嗪/氯雷他定+复方双花藤止痒擦剂。

幼儿湿疹：丁酸氢化可的松乳膏+复方双花藤止痒擦剂。

注意事项：过敏者禁用，过敏反应停用。皮肤破溃处慎用。

999 皮炎平

作用：主要用于过敏性和自身免疫性炎症性疾病。如局限性瘙痒症、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎、慢性湿疹等。

联合用药：999 皮炎平+湿毒清片/肤痒颗粒

不良反应：长期大量使用可继发细菌、真菌感染，局部可发生痤疮、酒渣样皮炎、皮肤萎缩及毛细血管扩张，并可有瘙痒、色素沉着、颜面红斑、创伤愈合障碍等反应。

注意事项：勿长期大面积使用。儿童须在成人监护下使用。

连续使用不能超过 4 周，面部、腋下、腹股沟及外阴等皮薄处连续使用不能超过 2 周。

丁克盐酸特比萘芬乳膏

作用：用于治疗手癣、足癣、体癣、股癣及花斑癣等。

联合用药：丁克盐酸特比萘芬乳膏+百癣夏塔热片。

不良反应：偶在用药部位出现发红、发痒或蛰刺感，但很少因此停药。

注意事项：仅供外用，避免误入眼内。应放在儿童不能拿到的地方。

不得用于皮肤破溃处，避免接触眼睛和其他黏膜（如口，鼻等）。孕妇及哺乳期妇女慎用。用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。

对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。